



Coqueluche

Fiche d'information



La coqueluche est provoquée par une bactérie.
La coqueluche peut s'attraper à tout âge.



La coqueluche se transmet d'une personne à l'autre par voie aérienne, généralement par la toux ou les éternuements. Une personne doit respirer des gouttelettes provenant d'une personne infectée pour tomber malade.

Signes et symptômes



Nez qui coule



Toux



Vomissements ou haut-le-cœur après une toux



Épuisement

Les premiers signes de la coqueluche ressemblent à ceux d'un rhume ordinaire : nez qui coule, légère fièvre ou inexistant et toux légère. Après une ou deux semaines de maladie, la toux se transforme et devient souvent soudaine et incontrôlable, une toux succédant à une autre sans pause ni respiration. Un bruit aigu lors de l'inspiration après un épisode de toux peut se produire.

La coqueluche peut être traitée par des antibiotiques, qui sont d'autant plus efficaces s'ils sont administrés tôt. La toux peut persister pendant de nombreuses semaines après le traitement, en particulier si le traitement est commencé tard dans la maladie.

Prévention



Se laver souvent les mains



Couvrir la toux avec la manche



Rester à la maison quand on est malade



Se faire vacciner (DTaP pour les enfants, Tdap pour les adultes)

Pour plus d'informations, consultez les sites :



1. www.maine.gov/dhhs/pertussis
2. www.cdc.gov/pertussis

Vous pouvez également appeler les CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies) du Maine au 1-800-821-5821.