

Lagarta da mariposa browntail




Informativo



As lagartas da mariposa browntail têm pequenos pelos venenosos que podem causar reações cutâneas semelhantes a hera venenosa e outras reações mais graves.

As lagartas podem chegar a 1,5 polegadas de comprimento e são marrons com uma listra branca de cada lado e duas manchas vermelhas/laranja na extremidade posterior.

Imagem do Serviço Florestal do Maine (Maine Forest Service)




As lagartas ficam ativas de meados de abril até o início de outubro. Os pelos são tóxicos por até três anos.

Sinais e sintomas



Erupção cutânea



Respiração e outros problemas respiratórios

O contato direto com os pelos pode causar uma erupção cutânea localizada, que pode durar desde algumas horas a vários dias. A erupção pode ficar vermelha, inchar e coçar. Algumas pessoas podem ter uma forma mais grave de erupção cutânea, que pode durar algumas semanas. Em alguns casos, os pelos podem ser inalados e causar problemas respiratórios. A erupção cutânea não é transmitida de uma pessoa para outra.



Não existe nenhum tipo de tratamento específico para a erupção causada pela mariposa Browntail. Os remédios caseiros podem ajudar com os sintomas. Isso pode incluir um banho frio com bicarbonato de sódio, pomada de hidrocortisona e loção de calamina. Caso você tenha dificuldade para respirar, engolir ou inchaço na boca, língua ou garganta, ligue para 9-1-1.


Prevenção



Tome um banho frio e troque de roupa após atividades em áreas com mariposas browntail para eliminar qualquer pelo.



Use máscara, óculos de proteção, e macacão quando estiver praticando qualquer atividade que possa espalhar os pelos da mariposa browntail, como por exemplo quando estiver recolhendo folhas.



Seque as roupas em dentro de casa durante os meses de junho e julho para evitar que os pêlos da mariposa fiquem nas roupas.



Faça trabalhos de jardinagem e apare as folhas em dias chuvosos para que os pêlos das mariposas não se espalhem.

Controle



Corte as teias de mariposas browntail no inverno e logo no início da primavera




Use uma mangueira para lavar embaixo das estruturas onde houver lagartas e aspire com aspirador que tenha filtro HEPA



Contrate um arborista/aplicador de pesticida licenciado

Após cortar as teias, mergulhe-as em água e sabão para destruí-las. Contrate alguém para cuidar das árvores afetadas antes do final de maio a fim de evitar o desenvolvimento de pelos tóxicos. O uso de pesticidas a 250 pés da água do mar é restrito.

Para obter mais informações, consulte:



1. www.maine.gov/dhhs/browntailmoth (inclui as perguntas mais frequentes)
2. www.maine.gov/dacf/mfs/forest_health/invasive_threats/browntail_moth_info.htm (inclui mapa com as áreas de risco da mariposa browntail)

Você também pode entrar em contato com o Maine 211 ao discar 211, enviar uma mensagem de texto com o seu CEP para o número 898-211, ou ao enviar um e-mail para info@211maine.org para obter mais informações.